Parasites / Périodes	Premier Trimestre			Deuxième Trimestre			Troisième Trimestre			Quatrième Trimestre		
	Janvier	**février**	**mars**	**avril**	**mai**	**juin**	**juillet**	**aout**	**septembre**	**octobre**	**novembre**	**décembre**
Moustiques	-les moustiques sont en diapose hivernale, c'est à dire qu'ils passent la saison froide sous forme d'oeuf, capable de survivre à des températures de -15°C mais également en absence d'eau	-les moustiques sont en diapose hivernale, c'est à dire qu'ils passent la saison froide sous forme d'oeuf, capable de survivre à des températures de -15°C mais également en absence d'eau	-suivant la précocité du printemps apparition des premiers moustiques -démarrage du cycle gonotrophique PIQÛRES → PONTEs→ACCOUPLEMENTS	-fin de la diapose hivernale les premières femelles assurent le cycle gonotrophique PIQÛRES → PONTES → ACCOUPLEMENTS -suivant la clémence des conditions climatiques 2ème génération d'adultes	-par conditions climatiques favorables de chaleur stable et précipitations fréquentes apparition de la 3ème génération adulte - le cycle biologique est de plus en plus rapide avec la hausse des températures	-par condition climatique favorable, chaleur stable et précipitations fréquentes ou abondantes, apparition de la 4ème génération de moustiques -moustiques plus résistants et agressifs	-par condition climatique favorable de chaleur sable et de précipitation fréquente ou abondante, APOGÉE DU NOMBRE DE MOUSTIQUES ET DE PIQÛRES + RISQUE ÉPIDÉMIQUE	-par condition climatique favorable de chaleur sable et de précipitation fréquente ou abondante, APOGÉE DU NOMBRE DE MOUSTIQUES ET DE PIQÛRES + RISQUE ÉPIDÉMIQUE	-par condition climatique favorable de chaleur sable et de précipitation fréquente ou abondante, APOGÉE DU NOMBRE DE MOUSTIQUES ET DE PIQÛRES + RISQUE ÉPIDÉMIQUE	-par maintien de conditions climatiques estivales après un été chaud et humide, il y a constance de la pression mordante -par condition climatiques plus fraiches, ralentissement du cycle gonotrophique	-ralentissement du cycle gonotrophique PIQÛRES → PONTES → ACCOUPLEMENTS -pontes d'oeufs spécifiques destinées à passer l'hiver qui résistent à des températures de -15° en état de diapose	-dernières activités des moustiques -comportement intrusif dans les habitations pour trouver la chaleur -ponte d'oeufs spécifique destinée à la diapose hivernale (résistant jusqu'à -15°)
	- profitez du répit hivernal pour vous équipez, commandez votre matériel de lutte anti-moustique chasseur de tigres - définir un plan de protection intégrée et un calendrier d'interventions	- Commandez votre matériel de lutte intégrée MOUSTIQUAIRES, LARVICIDES, PIÈGES INTÉRIEURS , EXTERIEURS, SOUPAPES ÉTANCHES, RÉPULSIFS	-capture des premiers moustiques qui sont à l'origine des colonies estivales -suivant résultat des pièges de capture installation des dispositifs de protection	-gestion des eaux stagnantes -traitement larvicide -utilisation des moustiquaires -utilisation des pièges de captures intérieur et extérieur	-gestion des eaux stagnantes - traitement larvicide - utilisation: moustiquaires + Pièges (inter/ exter) BG SENTINEL, BG GAT, SUNBURST + répulsifs (si besoin)	-gestion des eaux stagnantes + larvicide -utilisation: moustiquaires + pièges (inter/ exter) BG SENTINEL, BG GAT, SUNBURST ET RÉPULSIFS -traitement adulticide si besoin	-gestion des eaux stagnantes + larvicide -utilisation: moustiquaires + pièges (inter/ exter) BG SENTINEL + BG GAT, SUNBURST ET RÉPULSIFS -traitement adulticide si besoin	-gestion des eaux stagnantes + larvicide -utilisation: moustiquaires + pièges (inter/ exter) BG SENTINEL + BG GAT, SUNBURST ET RÉPULSIFS -traitement adulticide si besoin	-gestion des eaux stagnantes + larvicide -utilisation: moustiquaires + pièges (inter/ exter) BG SENTINEL + BG GAT, SUNBURST ET RÉPULSIFS -traitement adulticide si besoin	-très important d'empêcher les pontes -gestion des eaux stagnantes + larvicide -utilisation: moustiquaires + pièges (inter/ exter) BG SENTINEL + BG GAT, SUNBURST ET RÉPULSIFS	-très important d'empêcher les pontes -gestion des eaux stagnantes + larvicide -utilisation: moustiquaires + pièges (inter/ exter) BG SENTINEL + BG GAT, SUNBURST ET RÉPULSIFS	-très important d'empêcher les pontes -gestion des eaux stagnantes + larvicide - utilisation: moustiquaires + pièges (inter/ exter) BG SENTINEL + BG GAT, SUNBURST ET RÉPULSIFS
Mouches	-grâce aux conditions favorables de chaleur et de nourriture qu'elles trouvent à l'intérieur des habitations, les mouches relancent leur cycle de multiplication	-les conditions favorables de chaleur et nourriture quelles trouvent à l'intérieur des habitations relancent le cycle de multiplication des insectes chez vous	-grâce à notre climat tempéré et si vous avez correctement lutter contre les dernières mouches ou fait appel à notre équipe, un répit de mouches est possible	-par conditions climatiques favorables de chaleur stable et précipitations fréquentes le cycle biologique des mouches en extérieur redémarre progressivement	-par conditions climatiques favorables de chaleur stable et précipitations fréquentes le cycle biologique des mouches est plus rapide encore	-par temps orageux le comportement des mouches devient très agressif, elles mordent tout ce qui passe et se jettent sur la nourriture au mépris de leur vie	-par temps orageux le comportement des mouches devient très agressif, elles mordent tout ce qui passe et se jettent sur la nourriture au mépris de leur vie	-les mouches ont la fâcheuse habitude d'évoluer des matières en décomposition vers nos lieux de préparation alimentaire ou directement dans nos assiettes.	-les mouches véhiculent de nombreux agents pathogènes pour l'homme et les animaux, qu'elles contaminent par contact avec la nourriture	-la nuit tombée, beaucoup d'espèces de mouche sont attirées par la lumière artificielle des établissements et habitations si rien ne les en empêchent	-à l'approche de l'hiver, beaucoup d'espèce étant incapable de survivre à des températures inférieures à 10° les mouches pénètrent dans les habitations chauffées	-dans les endroits chauffés certaines espèces de mouches peuvent se maintenir en vie tout au long de l'année -à l'extérieur les populations ont disparu
	-différents procédés existent pour piéger chaque espèce en fonction de leurs spécificités -nous vendons les meilleurs destructeurs d'insectes, silencieux, inodore, sans fumé	c'est le moment d'utiliser vos : -destructeurs d'insectes (voir boutique) -fly trap & bande glu (voir boutique) -traitement en pulvérisation d'insecticide	-si ça n'est pas déjà le cas, équipez vous dès maintenant de nos moustiquaires convertibles et sur mesures, adaptables à tous types d'ouvertures et 100% efficaces	-nos moustiquaires portes et fenêtres, sur mesures, convertibles (système velcro) , offrent une protection 100% efficace contre les intrusions d'insectes volants	-nos moustiquaires portes et fenêtres, sur mesures, convertibles (système velcro) , offrent une protection 100% efficace contre les intrusions d'insectes volants	- pour ces moment particuliers il vous faut -moustiquaire chasseur de tigres -répulsifs à bases de pyrèthre du Kenya -destructeur insectes sans bruit ni odeur	- pour ces moment particuliers il vous faut -moustiquaire chasseur de tigres -répulsifs à bases de pyrèthre du Kenya -destructeur insectes sans bruit ni odeur	-pour les infestations avérées avant la mise en place d'un traitement préventif, un traitement de choc s'impose par pulvérisation d'insecticide biologique	-pour les infestations avérées avant la mise en place d'un traitement préventif, un traitement de choc s'impose par pulvérisation d'insecticide biologique	-nos moustiquaires portes et fenêtres, sur mesures, convertibles (système velcro) , offrent une protection 100% efficace contre les intrusions d'insectes volants	-nos moustiquaires portes et fenêtres, sur mesures, convertibles (système velcro) , offrent une protection 100% efficace contre les intrusions d'insectes volants	-maintenant qu'il existe peu de probabilité d'être à nouveau envahi depuis l'extérieur, il ne reste plus qu'à éliminer les dernières mouches à l'intérieur
Frelons	-hivernage des reines fondatrices -nids visibles mais inactifs et jamais réutilisés l'année suivante	-émergence des reines fondatrices	-émergence des reines fondatrices -petits nids visibles	-nids primaires	-apparition des premières ouvrières -la reine peut désormais se consacrer exclusivement à la ponte d'ouvrières uniquement stériles pour le moment	-nids de frelons asiatiques pouvant déjà atteindre 50 cm de diamètre -début de la prédation des abeilles	-nids de frelons asiatiques pouvant déjà atteindre les 70 cm de diamètre -accentuation de la prédation des abeilles	-apogée de la dimension des nids 90 cm en moyenne, parfois d'avantage -apogée également de la prédation des abeilles	-apogée de la dimension des nids 90 cm en moyenne, parfois d'avantage -apogée également de la prédation des abeilles	-la reine pond des mâles et femelles fertiles destinés à la reproduction -reproduction des mâles et femelles	-mort des mâles reproductifs et des ouvrières -survie des futures reines fondatrices -nids visibles mais inactifs	-hivernation des reines fondatrices -nids visibles mais inactifs, jamais réutilisés d'une année à l'autre
	-boucher les fissures dans les cloisons creuses contre les intrusions de frelons -solidarité abeilles, munissez vous d'une ruche domestique sans risque de piqûres	-détection des premiers vols de reines fondatrices -utilisation de pièges de captures	-détection des petits nids avant apparition du feuillage dense des arbres -utilisation des pièges	-repérage des va et vient et petit nids -utilisation des pièges	-repérage des va-et-vient et petits nids -utilisation des pièges -destructions des nids	-repérage des va-et-vient et petits nids -utilisation des pièges -destruction des nids -utilisation des moustiquaires	-repérage des va-et-vient et petits nids -utilisation des pièges -destruction des nids -utilisation des moustiquaires	-repérage des va-et-vient et petits nids -utilisation des pièges -destruction des nids -utilisation des moustiquaires	-repérage des va-et-vient et petits nids -utilisation des pièges -destruction des nids -utilisation des moustiquaires	-repérage des va-et-vient et petits nids -utilisation des pièges -destruction des nids -utilisation des moustiquaires	-fin de l'utilisation des pièges et de la destruction des nids suivant l'avancement de la saison	-pas d'actions pertinentes à mettre en oeuvre contre les frelons asiatiques -SAUVONS LES ABEILLES ! munissez vous d'une ruche domestique, facile d'entretien et sans risque de piqûres
Guêpes	-hivernage des reines fondatrices -nids visibles mais inactifs et jamais réutilisé l'année suivante	-émergence des reines fondatrices	-émergence des reines fondatrices -elles fabriquent un petit nid qui sera la base de la future colonie	-première ponte de la reine, qui ne se consacre plus à la fabrication du nid	-apparition des premières ouvrières adultes qui sont programmées pour continuer la construction du nid et ramener la nourriture aux larves et reines	-la reine se consacre alors exclusivement à la ponte -la colonie devient très importante et le nombre d'individus ne cesse d'augmenter	-les guêpes sont porteuses d'agent pathogènes pour l'homme car elles évoluent aussi bien sur les matières en décompositions que dans nos assiettes	-apogée de l'activité des guêpes -apogée des nids en toiture, sol, cloison, cheminée, boite aux lettres, dans les arbres -nuisance de l'activité humaine alentour	-apogée de l'activité des guêpes -apogée des nids en toiture, sol, cloison, cheminée, boite aux lettres, dans les arbres -nuisance de l'activité humaine alentour	-la reine pond des mâles et femelles fertiles destinés à la reproduction -reproduction des mâles et femelles	-mort des mâles reproductifs et des ouvrières -tandis que les futures reines fondatrices s'apprêtent à hiverner dans un lieu abrité	-hivernation des reines fondatrices -nids visibles mais inactifs
	-boucher les éventuels moyens de pénétrations des guêpes dans votre habitation: les fissures importantes dans les murs, les ouvertures de tuiles en u	-détection des premiers vols de reines fondatrices -utilisation de pièges de captures	-détection des premiers vols de reines fondatrices -utilisation de pièges de captures	-repérage des va et vient et petit nids -utilisation des pièges -traitement par pulvérisation d'insecticide biologique sur nids mineurs	-repérage des va et vient et petit nids -utilisation des pièges -traitement par pulvérisation d'insecticide biologique sur nids mineurs	-repérage des va-et-vient et petits nids -utilisation des pièges -destruction des nids -utilisation des moustiquaires	-repérage des va-et-vient et petits nids -utilisation des pièges -destruction des nids -utilisation des moustiquaires	-repérage des va-et-vient et petits nids -utilisation des pièges -destruction des nids -utilisation des moustiquaires	-repérage des va-et-vient et petits nids -utilisation des pièges -destruction des nids -utilisation des moustiquaires	-repérage des va-et-vient et petits nids -utilisation des pièges -destruction des nids -utilisation des moustiquaires	-destruction des nids -utilisation des pièges -utilisation des moustiquaires	-fin de l'utilisation des pièges et de la destruction des nids suivant l'avancement de la saison
Chenilles processionnaires	-fin de la nidification dans les pins chenilles devenues matures -suivant la faveur des conditions climatiques début des processions	-période de procession des chenilles qui descendent des arbres dans le but de trouver un lieu propice pour s'enterrer dans le sol (endroit plutôt ensoleillé)	-période de procession des chenilles qui descendent des arbres pour s'enterrer -avant de trouver un lieu pour s'enfouir les chenilles errent plusieurs jours	-fin des dernières processions tardives -enfouissement sous terre dans un endroit bien ensoleillé -sous la terre début de la nymphose	-nymphose sous terre, les chenilles processionnaires tissent des cocons individuels et se transforment en chrysalides (enfouies jusqu'à 10ans)	-vols des papillons un soir d'été -accouplement, puis les mâles meurent tandis que les femelles s'envolent -pontes ≈ 200 oeufs sur aiguilles de pins	-vols des papillons un soir d'été -accouplement, puis les mâles meurent tandis que les femelles s'envolent -pontes ≈ 200 oeufs sur aiguilles de pins	-vols des papillons un soir d'été -accouplement, puis les mâles meurent tandis que les femelles s'envolent -pontes ≈ 200 oeufs sur aiguilles de pins	-fin des vols de reproduction, les cocons restés dans le sol y passeront l'année -éclosion des premières chenilles juvéniles 30 à 45 jours après la ponte	-éclosion de toutes les chenilles pondues dans les arbres non traités -les chenilles juvéniles entament la nidification la nuit grâce à leur fil de soie	-progression de la nidification, les chenilles s'alimentent de nuit pour échapper aux oiseaux -2ème et 3ème stade des juvéniles	-nidification de 4ème stade de maturité -les chenilles déplacent leur nid dans les arbres jusqu'à défoliation, dans certain cas complète, des aiguilles de l'arbre
	-échenillage mécanique et incinération -éco pièges autour des pins touchés (capte les chenilles qui descendent) -installation de nichoir à mésanges	-échenillage mécanique et incinération -éco pièges autour des pins touchés (capte les chenilles qui descendent) -nichoir à mésanges (prédateur naturel)	-échenillage mécanique et incinération -éco pièges autour des pins touchés (capte les chenilles qui descendent) -nichoir à mésanges (prédateur naturel)	-nichoir à mésanges oiseaux prédateurs des chenilles processionnaires qui au printemps prélèvent les chenilles pour nourrir ses petits (1 nichoir 200m carrés)	-installation des pièges à phéromones pour la capture des papillons -observer la huppe fasciée oiseaux prédateur qui déterre les chenilles du sol	-installation des pièges à phéromones pour la capture des papillons -observer la huppe fasciée, oiseau prédateur qui déterre les chenilles du sol	-installation des pièges à phéromones pour la capture des papillons -observer la huppe fasciée, oiseau prédateur qui déterre les chenilles du sol	-installation des pièges à phéromones pour la capture des papillons -observer la huppe fasciée et installer les nichoirs à mésanges pour saison future	-derniers piégeages par phéromone -traitement par pulvérisation d'un insecticide biologique sélectif directement sur les nids des chenilles encore fragiles	-traitement biologique préventif -installation des nichoirs à mésange pour que l'oiseau le repère pour le printemps	-traitement biologique jusqu'à la fin du mois (après chenilles trop résistantes) -installation des nichoirs à mésange pour que l'oiseau le repère pour le printemps	-échenillage mécanique qui consiste à couper la branche où se trouve le nid -nichoir à mésanges qui prélèvent les chenilles directement à l'intérieur du nid
Souris	-avec une maturité sexuelle à 2 mois, les souris peuvent faire exploser leur population si aucune mesure n'est prise -forte odeur et virus prés des excréments	-les souris sont d'excellentes grimpeuses elles sont susceptibles de passé la plupart de leur temps en hauteur -elles s'éloignent peu les unes des autres	-se déplaçant énormément dans les bâtiment et aussi à cause de leur besoin insatiable de ronger, elles occasionnent de nombreux dégâts sur leurs chemins	-le comportement nocturne des souris facilite la sous-estimation de leur nombre -il est admis qu'une souris aperçu de jour correspond à la présence de 50 individus	-les souris sont connues pour leur comportement à nicher à l'intérieur des stocks de marchandises entreposés -elles peuvent aussi survivre sans eau	-avec les premières chaleurs et l'abondance de nourriture à l'extérieur les souris quittent peu à peu les bâtiments -par fois elles nichent à l'intérieur l'été	-les déjection et urines des souris sont fortement pathogène pour l'homme et les animaux après l'éradication la désinfection des locaux s'impose	-nettoyer les excréments de rongeurs s'impose pour des raisons d'hygiène mais prévient également des futures infestations	-dès que les souris ne parviennent plus à trouver leur nourriture à l'extérieur et que les températures nocturnes baisses, elles se rapprochent des bâtiments	-à l'automne avec les premiers froids et la rarification de la nourriture en milieux extérieur, les souris traversent les cours et pénètrent dans les bâtiments	-un couple de souris peut engendrer en une année une colonie des 70 individus -nettement moins farouches que les rats elles explorent volontiers chaque recoins	-les souris établissent leur nid et vivent à l'intérieur des bâtiments -elles se nourrissent la nuit, de façon hasardeuse et sporadique
	-la recherche de traces apparentes de leur présence permet d'implanter les postes d'appâtages sur les axes que les souris empreintes	-les postes d'appâtage sont également installés en hauteur sur la charpente, dans le grenier et sous les tuiles	-les postes d'appâtage sont aussi installés près des conduits de tuyauterie, des gaines techniques, ainsi que des câbles et armoires électriques	-il est préférable de disposer plus de postes d'appâtage que nécessaire que insuffisamment ce qui diminuerait fortement l'efficacité de l'appât	-emploi d'appâts professionnels reconnus pour leur grande appétence sur les souris qui le perçoivent comme une friandise, en consomment plus et plus vite	-grâce à nos caméra de surveillance à détection de mouvement nous sommes en mesure de savoir si votre site est toujours occupé par les souris	-en complément des chantiers de dératisation que nous assurons nous proposons également un service de désinfection fortement conseillé	-un chat est une bonne alternative pour lutter contre les souris car il perturbe leur intrusion, mais il ne peut rien quand les souris on envahis l'intérieur des cloisons	-débroussailler,tondre, dégager l'abord des bâtiment de matériaux entreposés -vérifier l'absence d'éventuel terrierrn, si présence de terrier traitement curatif	-boucher les accès aux souris -ne pas laisser de nourriture à leur porté -disséminer plusieurs postes de captures tout autour du site (adapter selon prises)	-selon les prises des pièges de capture, adapter un traitement préventif ou curatif -ne laisser aucune source de nourriture -en profiter pour donner les rodenticides	-compte tenu de leur curiosité les postes d'appâtage sont immédiatement visités -pour une bonne appétence des appâts éliminer toutes sources de nourriture
Rats	-avec une maturité sexuelle à 2 mois, les rats peuvent faire exploser leur population si aucune mesure n'est prise -forte odeur et virus prés des excréments	-les rats ont une vision faible (ne voit pas les couleurs), elle est largement compensée par des sens de l'odorat,du goût, du toucher et l'audition qui sont excellents	-à cette périodes la population de rats ayant élue domicile chez vous en début d'automne est maintenant importante -leurs déplacements créent des bruits	-les rats constituent des réserves de nourritures près de leur nid, les nombreux allés venus laissent des traces de gras, ces chemins mènent souvent à la colonie	-la présence de rats dégage une très forte odeur de musque et d'ammoniaque, ce mélange d'excréments, d'urines et de glandes odoriférante aide leur orientation	-nettoyer les excréments de rongeurs s'impose pour des raisons d'hygiène mais prévient également des futures infestations	-les locaux d'ordures ménagères et conteneurs poubelles sont très souvent des lieux fréquentés par les rats, ils nécessitent une attention particulière	-même en été, par leur comportement ultra opportuniste les rats sont susceptibles de pénétrer chez vous, ils passent sous les portes mal isolées	-dès que les rats ne parviennent plus à trouver leur nourriture à l'extérieur et que les températures nocturnes baisses, ils se rapprochent des bâtiments	-malgré leur comportement très méfiant les rats sont prêts à tout pour prendre la nourriture de l'homme où elles se trouvent -tous orifices représentent une voie d'accès	-il existe principalement deux espèces -le rat d'égouts : espèce la plus fréquente et la plus redoutable à chasser -le rat noir: rat de grenier qui vit en hauteur	-les rats rongent tout les matériaux qui les entourent, bois, plastiques, métaux, béton, ils agrandissent les trous grâce à leurs dents qui font des marques de 4 mm
	-la découverte d'excréments de rat est la meilleur preuve de leur présence, le nombre, la taille et la forme, donnent des indications sur la population présente	-il est primordial de bien pratiquer la dératisation avec des appâts de dernière génération, car en cas d'échec la dératisation suivante sera plus difficile	-des grattements dans les greniers indiquent la présence de rats noir -des grattements dans les sous-sols trahissent la présence de rats d'égout	-lors d'infestations avérées, l'utilisation de raticides professionnels est indispensable -il faut également leur condamner tout accès à l'eau surtout pour le rat d'égouts	-la vérification des lieux situés en hauteur comme les charpentes, les combles et greniers permet de dénicher la présence de rats noir, qui sont très bons grimpeurs	-en complément des chantiers de dératisation que nous assurons nous proposons également un service de désinfection fortement conseillé	-un chat est une bonne alternative pour lutter contre les rats car il perturbe leurs intrusions, mais il ne peut rien quand ils sont en grand nombre la nuit	-protéger votre habitation ou votre bâtiment de travail en commandant nos balais de portes anti-nuisible, vous pouvez également demander la pose	-débroussailler,tondre, dégager l'abord des bâtiment de matériaux entreposés -vérifier l'absence d'éventuel terrierrn, si présence de terrier traitement curatif	-boucher les accès aux rats -pour limiter les intrusions des rats explorateurs, aucune source de nourriture ne doit être à leur portée	-l'identification de l'espèce ou des plusieurs espèces présentent sur le site, va permettre de déterminer la méthode de lutte anti-rongeur la plus adaptée	-la recherche de traces apparentes de présence des rongeurs permet d'implanter les postes d'appâtages le long des axes que les rats empreintes
Taupes	-que la taupe n'étende pas son territoire de chasse en surface ne signifie pas qu'elle est quittée les lieux, elle agrandit surement sont territoire en profondeur	-si lorsque vous enfoncez un piquet vertical dans les taupinières, il descends profondément cela confirme qu'il s'agit bien de taupes, sinon d'autre fouisseurs	-le début du printemps constitue une période stratégique pour agir de manière à limiter la population des taupinières	-au printemps l'augmentation des besoin alimentaire des taupes (notamment à cause de la période de reproduction), font quelles creuses énormément de galeries	-étant donné que les sols sont humides et que les lombrics, représentant 90% de l'alimentation des taupes , se trouvent en surface, les taupes abîment les pelouses	-les jeunes taupes apprennent vite à se méfier des dangers qui les guettent et à mesurer les distances qui les en séparent.	-les taupes ne sont pas hémophiles contrairement à beaucoup de propos, elles sont au contraire formidablement robustes et résistantes	-les taupes ont réellement une vue médiocre car cela ne leur servirait à rien, en revanche leur système sensoriel est ultra développé ce qui leur permet la fuite	-les taupes sont de redoutables chasseuses grâce à un système de détection des proies très efficace, et elles éliminent les populations de lombrics	-la disparition massives des populations de vers de terre (lombrics) ajoutée aux galeries creusées par les taupes créent d'importants problèmes d'irrigation des sols	-la taupe possède six doigts au bout de ses membres supérieurs, qui ressemblent fortement à des doigts d'humain	-une taupe vie en moyenne 3 ans -leur maturité sexuelle se trouve à l'âge 11 mois, chaque année elles font 3 à 4 petits et exceptionnellement 2 portées
	-pour être sûr que l'on a bien à faire à la présence de taupe, il suffit de planter un piquet droit à la verticale d'une galerie d'évacuation et l'enfoncer profondément	-Réaliser les interventions avant la pousse de l'herbe permet de faciliter le traitement.	-Réaliser les interventions avant la pousse de l'herbe permet de faciliter le traitement.	-en tant que professionnel du comportement de la taupe nous savons quelles galeries piéger pour attraper rapidement la taupe	-le suivi de l'apparition de nouvelles galeries est très important, il permet de savoir quand il est possible d'attraper la taupe	-il est important de vérifier chaque jour l'évolution des galeries et de déplacer les pièges éventuellement détectés par la taupe	-la taupe évolue en surface lorsqu'elle se nourrit et tant que les températures ne sont pas trop chaudes, l'après midi elle recherche de la fraicheur en profondeur	-les pièges que nous utilisons pour capturer les taupes sont homologués et reconnus pour leur grande efficacité et leur sécurité pour enfants et animaux	-nous utilisons principalement deux modèles de pièges mécaniques, qui présentent chacun des avantages suivant le cas de figure de l'intervention	-il est indispensable de protéger votre terrain déjà affaibli par les galeries des taupes qui servent souvent d'entrée à une seconde infestation des campagnols	-à long terme si vous n'intervenez pas votre terrain est en proie au dessèchement du sol, de fragilité, d'effondrement et au gaz butyrique	-reboucher les trous fait aussi partie de notre travail pour empêcher l'intrusion d'autre nuisibles dans les galeries et pour prévenir les entorses de cheville
Volatiles	-la lutte à mettre en place dépend de l'attraction que votre site provoque chez les volatiles et de ce qu'il représente pour eux, lieu de repos, nourriture, copulation	-si aucune lutte n'est mise en place et que les volatiles parviennent à trouver beaucoup de nourriture aux alentours votre site risque d'être fortement envahit	-les volatiles par leurs déjections détériorent fortement les revêtements extérieurs des bâtiments et habitations, il bouchent également les gouttières	-les déjections des volatiles en plus d'être corrosives et d'attaquer les matériaux, ces fientes dégagent des odeurs particulièrement fortes et nauséabondes	-la formation des couples se produit sur des lieux propices à l'établissement des nids, souvent ces site sont connus des oiseaux et réutilisés chaque années	-le territoire d'accouplement s'il est propice, sera occupé pour toute la saison par le ou les couples et parfois même pour toute l'année	-les volatiles se reproduisent généralement rapidement, grâce souvent à plusieurs portées par an, le nombre de petits dépend de la nourriture présente	-certains oiseaux sont connus pour véhiculer de nombreuses maladies de plus ils sont susceptibles de s'introduire à l'intérieur de votre habitation ouverte	-les volatiles responsables de nuisances ont généralement changés leur comportement de prédateur naturel pour se nourrir au crocher de l'homme	-les volatiles comme de nombreux nuisibles profitent en été de l'abondance de nourriture en milieu rural, en hiver et après, ils profitent de l'activité humaine	-les oiseaux possèdent plusieurs territoire aux fonctions bien distinctes, territoire de repos, territoire de nourriture, territoire de reproduction, territoire de nidification	-les lieux les moins exposés aux dangers potentiels et qui bénéficient d'une nourriture abondante deviennent les lieux de nidification les plus touchés
	-les zones d'abris sont les plus difficiles à protéger, car ces sites attirent très fortement les volatiles, en grand nombre = protections maximum recommandées	-les zones où les volatiles se reposent régulièrement pendant la journée, exigent également un système de protection, dit "de bonne résistance" PICS et GEL	-les zones où les volatiles ne se reposent qu'occasionnellement, comme les partie les plus hautes des bâtiments, tolèrent des systèmes dit "de faible résistance"	-en complément des chantiers de lutte contre les volatiles, nous assurons également un service de désinfection, fortement conseillé	-c'est à cette période que les couplent de volatiles définissent, où vont-ils élever leur petits pour une période ≈ 6 mois - agissez et contactez nous sans attendre	-c'est à cette période que les couplent de volatiles définissent, où ils vont élever leur petits pour une période ≈ 6 mois - agissez et contactez nous sans attendre	-c'est à cette période que les couplent de volatiles définissent, où ils vont élever leurs petits pour une période ≈ 6 mois - agissez et contactez nous sans attendre	-nos moustiquaires sur mesures et convertibles représentent également un rempart efficace face aux volatiles car elles dissuadent de toutes intrusions	-nos moustiquaires sur mesures et convertibles représentent également un rempart efficace face aux volatiles car elles dissuadent de toutes intrusions	-nos différents systèmes de protection s'adaptent à l'attraction que votre site représente pour les volatiles, forte, moyenne ou minime pour le moment	-les pics une rangée sont une résistance minimum comme les systèmes à fils -les pics 3 rangées, filets , les systèmes électriques et gel = "de bonne résistance"	-les oiseaux sont des espèces protégées, il est interdit de tirer au fusil sur un oiseau dans son jardin ou sur son balcon, comme il est interdit de les nourrir
Sangliers	-des sangliers, on constate souvent seulement les dégâts, ces animaux étant essentiellement actif au crépuscule et de nuit, il est rare de les apercevoir de jour	-les sangliers sont capables de s'adapter à de nombreux milieux, ils sont très résistants et deviennent particulièrement dangereux lorsqu'ils sont blessés	-malgré leur comportement alimentaire vorace et opportuniste, les sangliers restent des animaux sauvages et méfiants qui mémorisent le danger	-c'est l'apogée des naissances dont la période chez les sangliers s'étale de février à juin, les laies ayant en moyenne 4 à 7 petits par an, en ont parfois 10	-c'est l'apogée des naissances dont la période chez les sangliers s'étale de février à juin, les laies ayant en moyenne 4 à 7 petits par an, en ont parfois 10	-les sangliers peuvent parcourir jusqu'à 30 km en une nuit, cela dit malgré des mouvements saisonniers, les cochons sauvages sont plutôt sédentaires	-en été les sangliers vont s'alimenter dans les champs de céréales et autre agriculture humaine, causant de gros dégâts aux végétaux et aliment du bétail	-en été les sangliers vont s'alimenter dans les champs de céréales et autre agriculture humaine, causant de gros dégâts aux végétaux et aliment du bétail	-par nature très opportunistes, les sangliers dont le mode alimentaire est omnivore, sont aussi capable de se nourrir des fruits des vergers et des vignes	-la prolifération des sangliers accentue les risques sanitaires, car le cochon sauvage est porteur de maladies pour l'homme et pour les animaux domestiques	-les dommages contre les clôtures sont importants et peuvent entraîner l'intrusion d'autre nuisible ou la fuite de vos animaux domestiques	-invasifs et de moins en moins timides, il arrive que l'on retrouve des sangliers au milieu des villes, profitant de l'abondance de déchets alimentaires
	-grâce à nos caméras de surveillance à détecteur de mouvement, nous sommes en mesure d'identifier clairement la population de sangliers présente sur site	-grâce à nos enregistrement vidéo des populations de sangliers qui fréquentent votre site, il vous est plus facile de convaincre les chasseurs d'une battue	-le comportement craintif et la mémorisations des sangliers des endroits potentiellement hostiles, garantis le succès d'effarouchement de nos balises	-nous vous conseillons d'agir aux premiers signes majeurs de la présence de sangliers, de cette manière votre site sera immédiatement identifié inhospitalier	-nous vous conseillons d'agir aux premiers signes majeurs de la présence de sangliers, de cette manière votre site sera immédiatement identifié inhospitalier	-la lutte contre les nuisance des sangliers ne doit pas reposer sur la seule régulation des populations par la chasse, mais sur un ensemble de moyens complémentaires	-à cette période de l'année s'est souvent le monde agricole qui est les plus touché -nos systèmes d'effaroucheur par balises sont durables et sans accoutumances	-à cette période de l'année s'est souvent le monde agricole qui est les plus touché -nos systèmes d'effaroucheur par balises sont durables et sans accoutumances	-à cette période de l'année s'est souvent le monde agricole qui est les plus touché -nos systèmes d'effaroucheur par balises sont durables et sans accoutumances	-de moins en moins de chasseurs chassent du gros gibier est relativement courte et limitée	-nos systèmes d'effaroucheur sonores déclenchés par faisceau laser et balises de délimitation, sont capables de produire 8 sons de prédateurs différent	-les locaux d'ordure doivent être protégés contre les nuisibles en tout genre dont les sangliers qui n'hésitent pas renverser les conteneurs ordures
Cafards	-les cafards sont des champions de l'évolution, ils étaient là avant nous et le seront après. Ils sont extrêmement robustes et très difficiles à combattre	-les blattes sont des insectes qui recherchent l'obscurité donc difficile à surprendre sauf la nuit et quand on allume la lumière d'une pièce sombre	-les blattes ont un mode de vie grégaire, d'un degré moindre que les sociétés d'abeilles ou fourmis, ils vivent aussi en groupe et ont une intelligence collective	-les blattes aux corps gras sont capables de performance de déplacement qui leur permet de se cacher et pondre dans des endroits dissimulés et inaccessibles	-les blattes sont des insectes particulièrement prolifiques, une femelle seule peut pondre 1500 oeufs et un couple peut engendrer 1 millions d'individus/ an	-les blattes se développent particulièrement bien et rapidement dans des conditions de chaleur et d'humidité permanente	-les blattes sont les ennemis des cuisines et salles de bains, mais aussi des entreprise agroalimentaire, boulangeries, centres thermales et centres aquatiques	-les espèces telle que la blatte américaine avec ses longues antennes sont à l'origines de nombreuses fermeture de restaurants	-les blattes sont omnivore et cannibales pour survivre. Lorsque vous marchez sur une blattes vous emportez avec vous toute sa descendance sous forme d'oeufs	-lorsque les blattes sont stressées ou en danger, elles libèrent instantanément tous leurs oeufs sur place, il est donc fortement deconseillé de les chasser au balais	-les blattes et cafards étant des insectes particulièrement robustes et bien cachés, il est fortement conseillé de demander une autre visite pour surveiller tout retour	-compte tenu de la difficulté et des complications que représente une infestation de cafards, la meilleur protection reste encore la prévention
	-fortement résistants à de nombreuses molécules insecticides et très prolifiques, seule la lutte intégrée au milieu permet de garantir des résultats satisfaisants	-nous intervenons de préférence de nuit au moment ou les cafards sont en pleine activité, afin d'identifier leurs différents trajets, voies de pénétrations et nids	-lorsque les cafards consomment nos appâts insecticides professionnels, ils meurt rapidement, leurs congénères se contaminent en mangeant leurs cadavres	-la lutte contre les nuisibles à comportement sociaux, tel que les blattes, nécessite également l'exclusion des sources de nourriture alternative et d'eau	-lorsqu'une zones infestée par les blattes est traitée, il est également conseillé de traiter préventivement les logements adjacents car une partie ira s'y réfugier	-durant notre intervention nous décelons l'ensemble des cachettes potentielles pouvant abriter des colonies de blattes pour apporter des solutions mécaniques	-pour limiter les zones de prolifération et créer un environnement hostile au développement des blattes, nous pouvons appliquer une peinture blanche	-ils fortement déconseillé d'écraser un cafard ou même d'essayer de les chasser au balais, car sous l'effet du stress, ils libèrent tous leur oeufs sur place	-un lieu infesté par les blattes doit être impérativement traité car cet endroit représente une source de contamination par les blattes de nombreux lieux de vie	-seules des solutions professionnelles couplées d'un programme de lutte intégrée permet d'impacter concrètement une colonie de blattes ou de cafards	-pour nos chantiers de lutte contre les nuisibles particulièrement résistants tels que les cafards, nous proposons à nos clients un contrat de visites préventives	-pour tous les professionnels des métiers de bouche et de l'hébergement, nous conseillons fortement un contrat préventif de sanitation contre insectes rampants
Fourmis	-les fourmis parviennent à pénétrer de nombreux emballages alimentaire et établissent parfois leur colonie au milieu même des stocks, sans trace extérieure	-certaines espèces de fourmis sont plus résistantes et plus longues à éliminer que d'autres, un suivi d'environ 10 jours après intervention initiale est vivement conseillé	-les fourmis sont des insectes sociaux parfaitement organisées, il est difficile de les combattre en raison de la complexité des trajets quelles empruntent jusqu'aux nids	-les fourmis sont des insectes fortement attirés par le sucre et les protéines, présents dans nos denrées alimentaires et sur les lieux de préparation culinaire	-l'identification de l'espèce rencontrée par piégeage permet de déterminer quel va être le traitement le plus efficace pour vous débarrassez de vos fourmis	-après l'identification de l'espèce rencontrée par piégeage, une inspection complète des espaces intérieur et extérieur par temps sec est indispensable	-pour se déplacer les fourmis ouvrières qui approvisionnent la colonie, suivent des pistes de phéromones déposées préalablement par les éclaireuses	-pour éliminer la colonie entière, notamment la reine et ses oeufs, l'insecticide doit être indécelable par les fourmis et largement consommé	-il existe aussi des solutions immédiates pour les lieux sensibles, comme les salles de restaurants où la présence de fourmis doit être rapidement éliminée	-pour les infestations les plus importantes ou les plus difficiles à contrôler nous appliquons un insecticide de dernière génération, sans résistance connue	-les fourmis ouvrières qui transportent la nourriture sur de grandes distances, préfèrent les appâts liquides qu'elles redistribuent plus facilement à la colonie	-les fourmis sont des insectes dont l'activité quotidienne dépend fortement de la température ambiante, l'hiver certaines espèces vont nicher dans les maisons
	-parallèlement au traitement professionnel toute source alternative de nourriture doit être retirée de la zone infestée par les fourmis	-les fourmis fantômes nécessitent 1 semaine de délai pour l'élimination de la colonie - fourmis noires nécessitent 2 à 3 semaines pour élimination de la colonie	-pour un traitement efficace contre les infestations et ré-infestations de fourmis, l'insecticide attractif employé doit être puissant, très attractif, avec délai d'action	-les stocks alimentaire et les zones de préparation doivent bénéficier d'une surveillance continue, contre la présence de fourmis grâce à des pièges à glu	-suivant l'espèce de fourmis rencontrée, les sirops appâts insecticides employés et la densité de quantité de produit nécessaire, sont différents	-l'identification des trajets, des endroits de pénétrations dans les bâtiments et dans le meilleur des cas, celle de l'emplacement des nids est fondamentale	-les trajets extérieurs allant au nid doivent être approvisionnés en poste d'appâtage d'insecticide attractif, afin que le maximum d'ouvrière en ramène au nid	-le succès du traitement demande également un délai d'action suffisant, pour permettant aux ouvrières d'approvisionner la colonie, avant la mort	-en dehors du traitement attractif de fond qui fait décliner les colonies en 10 à 14 jours, une pulvérisation complémentaire élimine directement les fourmis adultes	-cet insecticide permet de créer une véritable barrière qui tue toutes les fourmis qui la traversent par contact, suivie de la mort de l'insecte en quelques minutes	-nos appâts liquides sont plus rapidement et plus largement redistribués par les ouvrières à la colonie, rendant les traitements extrêmement efficaces	-les fourmis charpentières qui s'attaquent au bois, mais aussi les fourmis pharaons et fourmis d'argentine, sont à surveiller durant toute l'année dans les habitations
Punaises de lit	-les punaises de lits sont des parasites hématophages, c'est à dire qu'elles se nourrissent de sang -elles prolifèrent souvent dans les lits	-actuellement une très forte recrudescence des nuisances aux punaises de lits, alerte l'activité hôtelière mondiale et menace également les populations	-la persistance des oeufs de punaise de lit, qui parviennent à rester cachés dans les moindres recoins inaccessibles des habitations, provoque des sur-infestations	-les punaises de lits ne se déplacent jamais au grand jour mais toujours la nuit -la journée elles se cachent à proximité de la couche de leur proie nocturne	-les punaises de lits ont la fâcheuse habitude de se dissimuler dans les endroits impossible d'accès, ce qui les rend parfois indétectable par les humains	-afin d'échapper à l'importante vague de contamination qui touche l'ensemble des lieux d'hébergement et des logement collectifs et particuliers un moyen existe	-la longévité d'une punaise de lit varie entre 4 mois et un an selon l'alimentation -au cour de leur vie les femelles vont pondre chacune entre 200 et 500 oeufs	-l'un des point fort du cycle biologique des punaises de lits qui se déroule en trois phases oeufs, larves puis adultes est que se processus peut hiverner 4 mois	-pour se reproduire et avoir une descendance les punaises de lits doivent absolument prendre un repas sanguin, ce qui explique pourquoi elles nous mordent	-une punaise de lit est capable de mordre la même personne 60 fois en une nuit. Lorsque vous grattez trop les boutons, les sur-infections et cicatrices sont fréquentes	-face aux dégâts causés par les souillures de sang et les déjections des punaises de lit, il est très souvent obligatoire de jeter matelas et sommiers	-les punaises de lit n'aiment pas les températures basses, elles prolifèrent particulièrement bien l'hiver dans les habitations chauffées constamment
	-si vous observez des tâches de sang et des insectes plats ≈ 5mm dans votre lit -si vous êtes piquez sans savoir par quoi -contactez nous pour un diagnostique	-les infestation dû à ce parasite sont particulièrement difficiles à solutionner et souvent contraignantes, afin d'éviter les situations critiques contactez nous vite	-face à ces insectes très résistants la lutte intégrée au milieu est une fois de plus l'un des meilleurs moyen de se débarrasser des punaises de lits	-étant donné qu'il est difficile de détecter immédiatement leur présence, le phénomène est souvent négligé au départ et toujours regretté par la suite	-au contraire grâce à l'extraordinaire sens de l'odorat et entraînement de notre chien renifleur professionnel Max vous êtes sûr à 95% du diagnostique	-l'un de moyen de protection préventif le plus efficace et le plus durable est la housse de protection pour matelas et sommier, nous distribuons toutes tailles	-ces performances nous oblige une grande rigueur en matière de surveillance post-infestation, c'est pourquoi 1 mois après l'intervention initiale nous revenons	-les solutions professionnelles que nous employons ont la particularité d'éliminer les trois stades de développement des punaises de lit	-nous avons également le matériel qui permet de chauffer les habitation à une température des 60° pendant plusieurs heures ce qui tue toutes les punaises de lit	-une des solutions que nous vous proposons de manière préventive et curative, est notre filet imprégné destiné à aller sous votre matelas et faire barrière	-l'un des moyen de protection préventif le plus efficace et le plus durable est la housse de protection pour matelas et sommier, nous distribuons toutes tailles	-un moyen efficace pour rendre temporairement votre habitation hostile à tout insecte dont les punaises de lit, est d'aérer l'hiver jusqu'à la température de 10°
Puces	-les puces sont ectoparasites des mammifères et oiseaux, c'est à dire qu'à l'état adulte, elles vivent accrochées à l'épiderme de leurs hôtes	-la puce est un insecte hématophage, c'est à dire qu'elle se nourris de sang, chaque jour elle prélève 20 fois son propre poids en sang de victime	-chaque espèce de puce à son hôte spécifique, puce du chat, du chien, de l'homme, etc, mais en l'absence de cet hôte préférentiel elle change de victime	-si vous possédez des animaux de compagnie, le risque est qu'ils perdent les oeufs de puces présents dans leur pelage à l'intérieur de votre habitation	-en l'absence de votre chat, chien ou autre animal, les oeufs qui auront éclos dans votre maison, donneront des puces qui n'hésiteront pas à vous piquer	- à l'extérieur l'activité des puces dépend des saisons, en été très nombreuses -à l'intérieur des maisons grâce à la chaleur constante le cycle est annuel	-en période estivale le développement des puces est largement accéléré, leur nombre dans la végétation est important et les chances d'en ramener chez vous d'autant plus grandes	-la puce du chat représente la majorité des nuisances, elle très répandue en France, notamment dans le sud-ouest -elle change très facilement d'hôte	-les accouplements de la puce sont multiples et très précoces, les femelles pondent 20 à 30 oeufs chacune par jour qui arriveront à maturité en quelque jours	-deux aspects du comportement des puces les rendent difficiles à éradiquer, la capacité des femelles à retarder leur ponte ainsi que celles des nymphes prêtes à éclore	-les larves, juste avant le stade de nymphe, sont mobiles et photophobes, c'est à dire qu'elles se cachent de la lumière sous les tapis, plaintes et fentes	-attention au développement des oeufs de puce et autres parasite, dans le réservoir de récolte de déchets et poussières de votre aspirateur
	-fortement résistants à de nombreuses molécules insecticides et très prolifiques, seule la lutte intégrée au milieu permet de garantir des résultats satisfaisants	-si vous possédez des animaux domestiques il est fortement conseillé de les traiter régulièrement contre les puces car ils transportent leur oeufs sur eux	-si vous administrez un traitement préventif et régulier à vos animaux de compagnies et que vous vérifiez leur poil vous n'aurez pas de nuisance de puce	-soyez d'autant plus vigilant par rapport aux puces amenées par vos animaux domestiques, lorsque ces derniers sont souvent à l'extérieur, dans les bois	-lorsque un animal de compagnie quitte votre maison il ne prend pas forcement avec lui tous ses parasites, un traitement préventif est fortement conseillé	-nos solutions de lutte intégrée contre les puces consistent à mettre en place un calendrier d'actions et d'appliquer au bon moment pulvérisation et fumigation	-les formulations pulvérisables ou sous forme de fumigation employées sont soit un insecticide seul, soit un insecticide couplé d'un réducteur de croissance	-si vous possédez un ou plusieurs chats, en plus du traitement vétérinaire que vous pratiquez régulièrement nous vous proposons 3 visites annuelles préventives	-extrêmement prolifique les puces nécessitent des méthodes de lutte professionnelle sachant s'adapter à une éventuelle résistance aux insecticides	-l'effet à retardement (jusqu'à 6mois), de la ponte et de l'éclosion des nymphes, demande l'association de 2 insecticides complémentaires pour obtenir résultas	-lors de notre intervention nous inspectons et traitons systématiquement toutes les cachettes potentielles des larves qui pourraient sortir dans quelques mois	-lors de l'intervention notre agent vérifiera l'absence de parasites et de puces à l'intérieur de votre aspirateur, et y déposera un insecticide en préventif
Araignées	-les araignées ne sont pas des nuisibles au contraire, elles aident à réguler les population d'insectes volants et rampants -les faire sortir de la maison avec soins	-malgré leur comportement majoritairement inoffensif, les araignées ont tendance à faire peur voir même à déclencher, phobies et crises paniques	-il y a bien des avantages à cohabiter avec les araignées domestiques, cependant certains gros spécimens inspirent la crainte et l'insécurité	-à l'intérieur des habitations et bâtiments un grand nombre d'araignées peut souiller les tissus et le mobilier tels que les meubles, par leur déjections acides	-à l'extérieur des habitations et bâtiments un grand nombre d'araignées peut aussi dégrader l'aspect des façades par les multiples toiles et par les débris captés	-un grand nombre d'araignées présentes sur un site traduit souvent une forte présence d'insectes à proximité, qui révèle alors une 2ème infestation	-les espèces d'araignées vivant à l'extérieur sont largement plus présentes en été, les soirées fraiches ou lors de pluies, elles rentrent dans les habitations	-l'apogée des populations d'insectes volants, correspond parallèlement à une abondance d'araignées également stimulée par la chaleur et cette nourriture	-l'apparition des premiers froids et la forte diminution des populations d'insectes en extérieur, poussent les araignées à rentrer dans les maisons en automne	-les araignées sont également capables de libérer des poils urticants lorsqu'elles se sentent menacées, certaines espèces sautent et toutes savent utiliser le vent	-les morsures d'araignées injectent deux types de venin, un paralysant qui agit sur le système nerveux ou un autre nécrotique qui gangrène les victimes	-chaque année les services vétérinaires, les pompiers et agents anti-parasitaire sont appelés pour des cas concernant des araignées importées illégalement
	-concernant les araignées qui ont une place importante dans l'entomofaune nous cherchons à les éliminer le moins possible mais plutôt de les éloigner	-lors de notre intervention un diagnostic précis et une identification des espèces présentes chez vous sont réalisés pour écarter tous les dangers	-après les résultats du diagnostic et l'identification de vos araignées, inoffensives ou vulnérantes, vous choisirez l'élimination ou la répulsion	-même si quelques araignées sont bénéfiques, un trop grand nombre doit être régulé, dans ces condition nous réalisons un traitement insecticide curatif	-concernant les façades extérieures des habitations et bâtiments envahies par les toiles d'araignées le risque est d'altéré la qualité du bâtis par l'apparition d'humidité	-des toiles d'araignées actives et en grand nombre ne sont pas là par hasard, éliminer uniquement les araignées vous expose à d'autres infestations d'insectes	-nos moustiquaires portes et fenêtres, sur mesures, convertibles (système velcro) , offrent une protection 100% efficace contre les intrusions d'araignées	-nos moustiquaires portes et fenêtres, sur mesures, convertibles (système velcro) , offrent une protection 100% efficace contre les insectes volants et araignées	-nos moustiquaires portes et fenêtres, sur mesures, convertibles (système velcro) , offrent une protection 100% efficace contre les intrusions d'araignées	-lorsque vous allez dans une cave, dans des combles ou dans un garage, couvrez vos bras et mettez des gants, attention en rentrant le bois de cheminée ou autre	-une morsure d'araignées n'est pas à négliger, elle présente souvent un cercle blanc autour de la zone piquée, n'hésitez pas à consulter votre médecin	-les araignées sont des animaux sauvages, qu'il n'est pas possible de domestiquer, les espèces tropicales sont problématiques en cas de piqûres
Acariens	-les acariens sont considérés par les spécialistes de santé comme le second fléau parasitaire pour l'homme après les moustiques	-les acariens sont présents dans tous les environnements sur terre, en cas d'absence de nourriture ils survivent très longtemps en pratiquant le cannibalisme	-ce sont les déjections des acariens qui causent des nuisances, majoritairement dans nos matelas, c'est souvent l'origine de problèmes respiratoire tel que l'Astme	-la prolifération des acariens est ultra rapide à chaleur constante supérieur 20° - en 40 jours une femelles pond environ 2000 oeufs	-matelas, oreillers, coussins, canapés, tapis, moquettes, peluches d'enfants, pilles de linges et autre tissus et rideaux peuvent contenir des millions d'acariens	-les pucerons sont également une forme d'acariens de plante et de fruit, ils sucent la sève des végétaux par les feuilles ou par les racines	-les tiques sont aussi des acariens actuellement responsables de maladies graves véhiculées à l'homme ainsi qu'aux animaux sauvages et domestiques	-les tiques sont vectrices de pathologies graves pour l'homme, notamment la maladie de Lyme, qui est en forte recrudescence dans le monde et en Europe	-le symptôme alarmant suite à une piqûre de tique est lorsque vous remarquez une éruption cutanée en forme d'œil de bœuf qui s'étale.	-les enfants, les personnes à fragilité respiratoire et les personnes allergiques doivent impérativement être en présence des concentrations d'acarien les + faibles possibles	-en cas de fréquents éternuements répétés lorsque vous vous trouvez dans votre lit ou dans tout autre endroit de prédilection des acariens, contactez nous	-les femelle acariens pondent n'importe quand et n'importe où -pour certaines personnes les acariens représentent une importantes phobie
	-les acariens sont de redoutables envahisseurs qui ont colonisés l'ensemble de nos espace, seule la lutte intégrée au milieu donne de bon résultats	-en préventif la solution hautement efficace et durable que nous proposons sont les housses pour matelas et pour sommiers, comme barrière très efficace	-en intervention curative nous vous proposons différentes méthodes de lutte allant des pièges aux pulvérisations d'insecticides, mais aussi le biotraitement	-nos solutions professionnelles adaptées -pièges à glu et filets imprégnés -émulsions pulvérisables -fumigation de la pièce et du mobilier	-toutes les habitations, même les plus propres sont en proie aux acariens -le sèche linge pendant une heure à 60° est une solution de plus pour petits tissus	-actuellement une technique de lutte biologique consistant à introduire des acariens prédateurs auxiliaires se généralise dans le milieu horticole	-lorsque vous vous promenez dans votre jardin, dans la forêt ou dans tous endroit sauvages, vérifier l'absence de tique sur l'ensemble de votre corps à votre retour	-si vous détectez la présence d'une ou plusieurs tiques accrochées à votre peau, inutile de paniquer, munissez vous d'un tire tique pour les retirer avec leurs têtes	-si vous avez le symptôme décrit au dessus à la suite d'une piqûre de tique consultez immédiatement votre médecin -vous pouvez consultez sans symptôme	-en complément des solutions professionnelles, le fait d'aérer votre maison 15 minutes par jour diminue la densité de vos populations d'acariens	-lors de notre intervention grâce à notre matériel d'observation, nous sommes en mesure de faire un diagnostic précis et immédiat d'un habitat et de ses faiblesses	-si vous désirez ne plus avoir de problèmes d'acarien, vous devez habiter au dessus de 1500 mètres d'altitude, les acariens y sont quasi absents
Mîtes	-il existe deux sortes de mîtes, les mîtes alimentaires ou pyrales et les mîtes des textiles appelées aussi teignes des vêtements	-pour les deux espèces de mîtes, les mîtes alimentaires et celles des vêtements, c'est la forme juvénile qui est à l'origine de nuisance, au stade larvaire	-les deux formes de mîtes, alimentaires et des textiles, vivent à l'état sauvage dans les arbres (souvent les tilleuls). Elles sont attirées par la lumière des maisons	-les mîtes des textiles ont la particularité de résister à des température élevées (+35°) et de se développer sans eau, cela fait d'elles des dures à cuire	-les mîtes des textiles pondent deux fois par an entre 50 et 100 oeufs, les accouplements ont lieu de nuit ce qui rend l'évaluation de l'infestation parfois difficile	-les mîtes alimentaires sont plus fertiles encore, elles pondent environs 200 oeufs minuscules qui écloront au bout de 3 à 4 jours, et seront papillons en 1 mois	-les mîtes alimentaires ont pour habitude de pondre dans les paquets de farine ouverts, les légumes secs, le chocolat, les pâtes, etc…	-les formes de mîtes qu'il est possible de rencontrer, soit les mîtes alimentaires soit les mîtes du textile, causent des dégâts coûteux, l'idéal est donc la prévention	-étant donné la rapidité de multiplication de ces insectes lors de condition climatique favorable, il est utile de surveiller le moindre pic d'augmentation	-avec l'apparition des premiers froids et attirées par la lumière intérieure des habitations, les mîtes rentrent dans les maisons où les conditions sont idéales	-les teignes et pyrales sont connues depuis longtemps pour leurs dégâts, elles ont d'ailleurs développé des résistances aux insecticides de bases utilisés	-si vous êtes un professionnel de la restauration, un stock d'alimentation ou alors un professionnel de la filière textile, un contrat de prévention s'impose
	-les deux formes de mîtes sont assez difficiles à éradiquer totalement, car ces petits papillons pondent des oeufs en masse qui écloront à retardement	-les mîtes ayant la possibilité d'être rencontrées sous trois formes, oeufs, larves ou papillons, la lutte intégrée répond parfaitement à la lutte anti-mîtes	-nos moustiquaires portes et fenêtres, sur mesures, convertibles (système velcro) , offrent une protection 100% efficace contre les intrusions des différentes mîtes	-il est fortement conseillé de détruire tous cocons avant l'apparition des larves, car elles éclosent toutes en même temps (10j après la ponte) et sont très voraces	-c'est la forme larvaire qui est nuisible, très vorace à l'aspect d'un petit verre blanc, ces larves trouent des pilles de vêtements à la verticale, sans problème	-la lutte contre les mîtes alimentaires demande des solutions professionnelles permettant d'éliminer les mîtes adultes, mais également les oeufs et les larves	-en parallèle du traitement professionnel que nous assurons nous demandons à nos clients de détruire tout paquet de nourriture présent lors de l'infestation	-lorsque vous avez déjà eu à faire aux mîtes ou pour les professionnels du textile, nous proposons un traitement préventif, assorti de pièges témoins	-pour garder une longueur d'avance sur ces insectes aux éclosions de masse et spontanées, il est essentiel de pratiquer un piégeage adapté au site à protéger	-nos moustiquaires portes et fenêtres, sur mesures, convertibles (système velcro) , offrent une protection 100% efficace contre les intrusions des différentes mîtes	-grâce à nos formulation d'insecticides professionnelles, nous sommes en mesure d'adapter notre traitement en fonction du type d'infestation rencontrée	-avec nos contrats de visites régulières, généralement planifiées à raison de 3 à 4 passages d'inspections annuelles, nous vous garantissons la tranquillité d'esprit
Pyrales du Buis	-les buis sont des arbustes robustes et faciles d'entretien, néanmoins depuis peu un ravageur venu d'Asie, décime les buis des particuliers et des parques publiques	-la pyrale du buis colonise de nombreux départements Français, dont ceux de la bande Aquitaine comme, la Gironde, les Landes et les Pyrénées Atlantiques	-par sa propagation fulgurante la pyrale du buis menace les paysages des jardins privés comme publiques, en n'épargnant pas les sites historiques et les cimetières	-si vous constatez des attaques de pyrale du buis sur vos arbustes ne tardez pas pour les traiter ou faire appelle à nos services et n'oubliez pas de prévenir vos voisins	-pour les buissons isolés ou les petites haies il est possible de faire l'échenillage à la mains, pour les grandes parcelles le traitement insecticide s'impose	-le papillon de nuit de la pyrale de buis se nourrit du nectar des fleurs avoisinantes, il est blanc au centre avec une bande grise tout autour des ailes	-de jour le papillon de la pyrale du buis est très craintif, il s'envole et s'enfuit dès que l'on remue la feuille sous laquelle il se repose durant la journée	-le papillon de la pyrale du buis vit environ 8 jours, durant lesquels les femelles pondent des oeufs en forme d'oeuf au plat, sous les feuilles de buis	-les oeufs déposés par le papillon de la pyrale du buis éclosent rapidement et les jeunes chenilles commencent à dévorer immédiatement les feuilles de buis	-lors de la récupération des chenilles de la pyrale du buis il ne faut surtout pas jeter les chenilles ainsi que les végétaux au compose ou ailleurs,il faut incinérer	-si les dégâts ne sont pas détectés à temps après la défoliation complète de l'arbuste, si le chenilles attaquent l'écorce tendre de la plante, cela est fatal au buis	-dépendante de conditions climatiques favorables, en hiver l'activité des chenilles de la pyrale du buis s'arrête, elles hivernent à l'abri sous une feuille
	-si vous possédez des buis il est de leur survie que vous les surveillez attentivement et régulièrement, la pyrales est une chenille très vorace	-la vérification de vos buis doit être méthodique et approfondie, il ne faut pas oublier de surveiller l'intérieur et les côtés de vos arbustes	-les symptômes d'attaques sur les buis sont l'apparition de tâches brunes sur les feuilles et des parties dénudées, où l'on peut observer des feuilles dévorées	-bien souvent ce qui détermine le sort de vos buis suite à une attaque de pyrales, c'est la précocité de l'intervention et bien sur la qualité de la solution insecticides	-lors de petites infestations nous appliquons un traitement biologique, efficace en préventif et sur les chenilles juvéniles de moins de 2,5 cm de long	-lors de notre intervention chez vous, nous installons des pièges à phéromones destinés à capter les papillons de la pyrale du buis et confirmer leur présence	-en cas d'attaque massive et temporaire, en alternative aux pulvérisations d'insecticides, nous pouvons mettre en place un filet de protection sur vos buis	-en cas d'attaque massive et temporaire, en alternative aux pulvérisations d'insecticides, nous pouvons mettre en place un filet de protection sur vos buis	-en cas d'attaque massive et temporaire, en alternative aux pulvérisations d'insecticides, nous pouvons mettre en place un filet de protection sur vos buis	-pour les petites parcelles de buis à protéger nous utilisons pour la récupération des chenilles un aspirateur broyeur, dont nous incinérons le contenu	-il est important pour toutes les méthodes de protections des buis de vérifier les résultats régulièrement après les interventions et d'utiliser des pièges	-même pendant l'hiver vous pouvez scruter l'intérieur de vos buis mais aussi les feuilles des plantes avoisinantes, à la recherche d'éventuels cocons de chenille
Pyrales du palmier	-la pyrales du palmier est un ravageur récemment introduit en France, venu d'Asie ce papillon cause de très sévères dégâts sur les palmiers (surtout les + fibreux)	-en 2015 la pyrale du palmier n'occasionnée des ravages que sur les palmiers des départements du sud-est de la France, mais sa dispersion est rapide	-l'une des difficultés que présente la lutte la pyrale du palmier, est le caractère invisible de l'attaque au début et souvent fatal lors de l'apparition des symptômes	-la pyrale du palmier touche les départements côtiers de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Languedoc-Roussillon et s'étend désormais vers le Sud-Ouest	-des cas isolés d'attaque de pyrales du palmier ont également été rapportés, à la suite de transports de plant en dehors des zones touchées.	-la pyrale du palmier s'attaque particulièrement à 2 espèces de palmier, ceux du genre Trachycarpus et Trithrinax, mais également aux autres espèces	-comme la plupart des insectes le papillon de la pyrale du palmier connait son pic d'activité à la saison chaude, il mesure 10 cm et est de couleur orangée	-le papillon de la pyrale du palmier s'accouple de juillet à août, lors de soirées chaudes, les oeufs sont ensuite pondus sur le tronc des palmiers	-la lutte contre la pyrale du palmier et sa déclaration en mairie sont obligatoire car ce ravageur fait l'objet d'arrêté ministériel pour la protection de environnement	-la pyrale du palmier qui appartient à la famille de lépidoptères et un parasite redoutable à combattre car son développement biologique suit 4 phases	-les symptômes alarmant trahissant une attaque de pyrales sur vos palmiers sont l'émergence de feuilles perforées, présence de sciure brune et parfois bruit	-nos chers palmiers sont également menacés par un deuxième ravageur qui est le charançon rouge qui peut s'associer aux larves de pyrales et tuer vos arbres
	-Lorsque vous achetez des palmiers importés ou autre plantes importées vérifiez l'absence de parasites sur votre plante avant de l'introduire chez vous	-peut d'études existent sur la dispersion de la pyrale du palmier en France et en Europe, cependant l'expansion et certaine, donc faites surveiller vos arbres	-il est très utile de faire un traitement préventif sur vos palmiers afin de les protéger contre une éventuelle attaque de pyrales, lente, invisible, souvent fatale	-il est très utile de faire un traitement préventif sur vos palmiers afin de les protéger contre une éventuelle attaque de pyrales, lente, invisible et donc souvent fatale	-en cas de risque de contamination évident durant cette période, nous vous proposons d'ensacher vos palmiers dans un filet insecticide qui les protège à 100%	-si les palmiers que vous possédez appartiennent aux genres cités au dessus alors vous devez être particulièrement vigilant et prévoyant pour vos arbres	-si vous observez 1 gros papillon aux belles couleurs orangées tourner autour de vos palmiers, contactez nous il s'agit du Paysandisia Archon, pyrale du palmier	-nous installons des pièges de capture à phéromones qui agissent de manière à éliminer le papillon de la pyrale et prévenir de la présence du ravageur	-lorsque vous constatez la présence de papillons marron au repos et orangés en vol autour de vos palmiers, il est aussi important de prévenir vos voisins	-pour la lutte contre la pyrale du palmier qui implique de combattre un papillon, des oeufs, des nymphes et des larves phytophages, la lutte intégrée s'impose	-pour sauver vos palmiers de la pyrale Paysandisia Archon, c'est la détection qui prime, visuelle ou à l'aide de nos pièges, la pie est aussi une prédatrice des larves	-l'ensachement de vos palmiers, que nous proposons, est réalisé à l'aide d'un filet insecticide, protégeant vos arbres à 100% contre toutes attaques de ravageurs
TERMITES	-les termites et insectes xylophages sont très fortement présent en Aquitaine, notamment dans le département des Landes où de nombreux foyers existent	-en milieu naturel les termites recyclent le bois mort, dans les habitations elles causent d'important dégâts en s'attaquant au bois de construction et de mobilier	-les dégâts causés par les termites sont généralement plus importants que les infestations d'autres insectes xylophages, car l'attaque est difficilement détectable	-si vous construisez votre maison ou autre bâtiment en Aquitaine, il est fortement conseillé de poser tout autour de la chape une bande anti-xylophages	-en France les espèces de termites sont sous-terraines et elles remontent dans les habitations et bâtiments par le sol et par la base des pièces de charpentes	-sans intervention l'activité des termites et plus particulièrement celle de leurs larves, affecte sévèrement la solidité des constructions jusqu'à l'effondrement	-les termites et autres insectes xylophages affectionnent les conditions chaudes et humides, les habitations mal ventilées sont donc plus fragiles	-la reproduction reproduction des espèces de termite à généralement lieu en été, cela se produit par essaimage d'insectes aillés ou par clonage	-les termites redoutent l'exposition a la lumière par nature et laissent quasiment aucune trace de leur passage, seul le bruit creux au choc indique une anomalie	-une des rares traces observable laissée par les termites est la découverte de cavités ciment dépourvues de vermoulure qui sont des aérations pour les insectes	-c'est à l'approche de la saison froide que las termites et insectes xylophages viennent trouver la chaleur et le confort dans nos habitations et bâtiments	-en présence d'infestations avérées de termites, il est possible la nuit de les entendre dévorer le bois, il est urgent de sauver votre habitation
	-les sinistres causés par les termites et autres insectes xylophages, ainsi que tous travaux de lutte contre ces insectes, sont à déclaration obligatoire en mairie	-si vous habitez en milieu boisé ou en zone infestée par les termites, il est fortement conseillé d'installer un périmètre préventif autour de l'habitation	-les attaques de termites au début sont invisibles, il est difficile de trouver les symptômes, seule l'installation de pièges que nous assurons signalent une activité	-pour tous les chantiers en constructions, nous vous proposons d'installer des solutions préventives et durables pour protéger votre futur bâtiment ou maison	-de manière préventive, il faut concentrer les actions de surveillance performantes et traiter préventivement les parties boisées les plus exposées	-de manière curative les chantiers anti termites se font des bas étages vers le haut, par injection et aspersion de xylophène sur les parties boisées	-contactez nous afin de réaliser un diagnostic de votre habitation, grâce aux résultats nous pouvons déterminer s'il faut agir de manière préventive ou curative	-en France et particulièrement en Aquitaine, les montants des dégâts occasionnés par les termites et insectes xylophages ne cessent d'augmenter	-des solutions alternatives aux traitements chimiques existent, comme les unités de diffusions d'ondes courtes, très efficaces mais qu'il faut déplacer mètre par mètre	-si vous possédez une cheminée ou si vous utilisez du bois dans un autre intérêt, veillez à ne pas acquérir de bois contaminé et ne le rentrer pas chez vous	-à cette période il faut redoubler de vigilance et contrôler souvent les pièges de détections placés autour de la construction et aux endroits stratégiques	-lors de sinistres très avancés il est parfois impossible de réhabiliter l'habitation ou le bâtiment, tant que les parties de bois encore saines sont inexistantes